

# MANEJO DE SU CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO CON ORGOVYX

Este no es un paciente real.

## ¿Qué es ORGOVYX?

ORGOVYX es un medicamento recetado que se utiliza en adultos para el tratamiento del cáncer de próstata avanzado. No se sabe si ORGOVYX es seguro o efectivo en mujeres o niños.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

**No tome ORGOVYX** si ha tenido una reacción alérgica severa a relugolix o a cualquiera de los componentes de ORGOVYX.

Consulte la **Información importante de seguridad** en todo el folleto y la **Información de prescripción** completa y la **Información del producto para el paciente** sobre ORGOVYX.

**ORGOVYX**<sup>®</sup>  
(relugolix) 120 mg  
tablets

## ORGOVYX

es **la única terapia oral** de privación de andrógenos (ADT), y demostró **disminuir los niveles de testosterona y PSA\*** en adultos con cáncer de próstata avanzado.

ORGOVYX es el único medicamento de ADT que **no es inyectable.**



El comprimido no se muestra en tamaño real.

\*Si bien no era el objetivo principal del ensayo clínico, se controlaron los niveles de PSA (antígeno prostático específico). Dado que el ensayo clínico incluyó muchos tipos diferentes de pacientes, los resultados del control de PSA se debe interpretar con precaución. No hay evidencia que demuestre que la rapidez con que disminuye el PSA esté relacionada con un beneficio clínico.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

#### ¿Qué debería decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar ORGOVYX?

**Dígale a su proveedor de atención médica todas las afecciones médicas que tenga**, incluido si usted:

- Tiene algún problema de corazón, incluida una afección denominada síndrome de QT prolongado.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. ORGOVYX puede dañar a su bebé por nacer y causar la pérdida del embarazo (aborto).

Consulte la **Información importante de seguridad** en todo el folleto y la **Información de prescripción** completa y la **Información del producto para el paciente** sobre ORGOVYX.

**ORGOVYX**<sup>®</sup>  
(relugolix) 120 mg  
tablets

# SU GUÍA PARA ORGOVYX

Si vive con cáncer de próstata avanzado, puede parecer abrumador considerar cuáles son los pasos a seguir. Tomarse el tiempo para conocer todo lo que pueda sobre su tratamiento es una buena forma de comenzar a sentir que toma el control.

## EN ESTA GUÍA

<a href="#">Acerca del cáncer de próstata avanzado</a> .....	4
<a href="#">El papel de la testosterona en el cáncer de próstata</a> .....	5
<a href="#">Cómo funciona ORGOVYX</a> .....	8
<a href="#">Cómo puede ayudar ORGOVYX</a> .....	9
<a href="#">Cómo tomar ORGOVYX</a> .....	13
<a href="#">Cómo entender los efectos secundarios</a> .....	15
<a href="#">Cómo conseguir ORGOVYX</a> .....	17
<a href="#">Apoyo y asistencia económica para pacientes</a> .....	19

Consulte la Información importante de seguridad en todo el folleto y la **Información de prescripción completa y la Información del producto para el paciente** sobre ORGOVYX.





## INFORMACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE PRÓSTATA AVANZADO

Cuando le diagnosticaron cáncer de próstata avanzado, es posible que el médico le haya dicho que era **recurrente**, **localmente avanzado** o **metastásico**. Esos son tipos de cáncer de próstata avanzado.

### Recurrente

Cuando el cáncer de próstata ha reaparecido, después de un tratamiento inicial, como radioterapia o cirugía, según lo detectado por un aumento del nivel de PSA\* o por biopsia o escaneo

\*PSA significa antígeno prostático específico.

### Localmente avanzado

Cuando el cáncer de próstata se ha diseminado a tejidos cerca de la próstata

### Metastásico

Cuando el cáncer de próstata se ha diseminado lejos de la próstata, a otras partes del cuerpo, como los huesos, el hígado o los pulmones

# EL PAPEL DE LA TESTOSTERONA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA

La testosterona es la hormona masculina que la mayoría de los cánceres de próstata necesitan para crecer. Ese es el motivo por el que el cáncer de próstata avanzado a menudo se trata con terapia hormonal, lo que ayuda a disminuir la cantidad de testosterona que el cuerpo produce. **Su médico posiblemente le hable sobre un tipo de terapia hormonal denominada ADT, o terapia de privación de andrógenos. Hable con su médico sobre los beneficios y los riesgos de la ADT.**

**Hay 2 tipos de medicamentos de ADT: los agonistas de LHRH\* y los antagonistas de GnRH†**

## Ejemplos de agonistas de LHRH



Lupron Depot® (acetato de leuprolida para suspensión de liberación prolongada)



Eligard® (acetato de leuprolida para suspensión inyectable)

\*LHRH significa hormona liberadora de hormona luteinizante.

## Ejemplos de agonistas de GnRH



Firmagon® (degarelix para inyección)



ORGOVYX® (relugolix)

†GnRH significa hormona liberadora de gonadotropina.

Lupron Depot es una marca registrada de AbbVie Inc. Eligard es una marca registrada del grupo Tolmar. Firmagon es una marca registrada de Ferring B.V.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

### ¿Qué debería decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar ORGOVYX? (cont.)

**Dígale a su proveedor de atención médica todas las afecciones médicas que tenga, incluido si usted:**

- Tiene una pareja que está embarazada o puede quedar embarazada.
- Los hombres que tienen parejas de sexo femenino que pueden quedar embarazadas deben usar métodos efectivos para el control de la natalidad (anticonceptivos) durante el tratamiento con ORGOVYX y durante 2 semanas después de la última dosis de ORGOVYX.

Consulte la **Información importante de seguridad en todo el folleto y la Información de prescripción completa y la Información del producto para el paciente sobre ORGOVYX.**

**ORGOVYX**<sup>®</sup>  
(relugolix) 120 mg  
tablets

# EL PAPEL DE LA TESTOSTERONA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA

## Los 2 tipos de medicamentos de ADT funcionan de forma diferente para disminuir la testosterona

### Los agonistas de LHRH actúan activando primero algunos receptores hormonales

Al inicio de la terapia, los agonistas de LHRH "encienden" (o activan) determinados receptores hormonales. Eso aumenta los niveles de testosterona antes de reducirlos. Ese aumento temporal de los niveles de testosterona puede durar unas semanas. Se denomina "estallido de la testosterona". El estallido de la testosterona puede empeorar determinados síntomas en algunos pacientes. Si eso ocurre, los pacientes pueden necesitar otros tratamientos para aliviar los síntomas.

AGONISTA DE  
de LHRH

### Los antagonistas de GnRH actúan bloqueando directamente algunos receptores hormonales

Al bloquear (o inhibir) directamente determinados receptores hormonales, los antagonistas de GnRH reducen los niveles de testosterona sin aumentarlos primero. Eso produce una disminución de los niveles de testosterona sin causar un estallido de la testosterona.

Antagonista de  
GnRH

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

#### ¿Qué debería decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar ORGOVYX? (cont.)

Dígale a su proveedor de atención médica todas las afecciones médicas que tenga, incluido si usted:


- Está amamantando o planea amamantar. No se sabe si ORGOVYX pasa a la leche materna.

Consulte la Información importante de seguridad en todo el folleto y la [Información de prescripción](#) completa y la [Información del producto para el paciente](#) sobre ORGOVYX.

**ORGOVYX**<sup>®</sup>  
(relugolix) 120 mg  
tablets

# EL PAPEL DE LA TESTOSTERONA EN EL CÁNCER DE PRÓSTATA

## Cómo afectan la testosterona los antagonistas de GnRH y los agonistas de LHRH



Los agonistas de LHRH provocan un aumento inicial de los niveles de testosterona antes de reducirlos. Los antagonistas de GnRH reducen los niveles de testosterona sin provocar un estallido de la testosterona.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

#### ¿Qué debería decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar ORGOVYX? (cont.)

**Menciónale a su proveedor de atención médica todos los medicamentos o tratamientos que recibe**, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar ORGOVYX con algunos otros medicamentos puede afectar la forma en que ORGOVYX funciona o puede causar efectos secundarios.

No debe comenzar ni suspender ningún medicamento antes de hablar con el proveedor de atención médica que le recetó ORGOVYX.


Consulte la Información importante de seguridad en todo el folleto y la [Información de prescripción](#) completa y la [Información del producto para el paciente](#) sobre ORGOVYX.

**ORGOVYX**<sup>®</sup>  
(relugolix) 120 mg  
tablets

# CÓMO FUNCIONA ORGOVYX

La disminución de la testosterona es una de las principales formas de tratar el cáncer de próstata avanzado. ORGOVYX funciona para disminuir la cantidad de testosterona que el cuerpo produce. Como resultado, eso ayuda a disminuir la cantidad de testosterona en el cuerpo.

Imagine que el cuerpo produce testosterona como si fuera agua que sale de un grifo



**Sin tratamiento, el grifo se abre**  
y la testosterona fluye libremente.



**Con ORGOVYX, el grifo está casi cerrado**  
y el flujo de testosterona disminuye. Eso significa que  
hay menos testosterona.



Es importante recordar que **reducir la testosterona es una de las formas principales de tratar el cáncer de próstata avanzado.**

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ORGOVYX?

- **Los efectos secundarios severos de ORGOVYX incluyen cambios en la actividad eléctrica del corazón (prolongación del intervalo QT).** Posiblemente su proveedor de atención médica controle los niveles de sales corporales (electrolitos) y la actividad eléctrica de su corazón durante el tratamiento con ORGOVYX. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si presenta algún signo o síntoma de prolongación del intervalo QT, incluidos mareos, desmayo, sensación de que el corazón late fuerte o de forma acelerada (palpitaciones) y dolor de pecho.
- **Los efectos secundarios severos de ORGOVYX incluyen reacciones alérgicas.** Deje de tomar ORGOVYX e informe a su médico o busque atención médica de emergencia de inmediato si presenta cualquier signo o síntoma de una reacción alérgica, incluidos hinchazón de la cara, labios, lengua, garganta o dificultad para tragar; dificultad para respirar; y urticaria (ronchas elevadas), erupción cutánea o enrojecimiento en todo el cuerpo.

Consulte la **Información importante de seguridad** en todo el folleto y la **Información de prescripción** completa y la **Información del producto para el paciente** sobre ORGOVYX.

**ORGOVYX**<sup>®</sup>  
(relugolix) 120 mg  
tablets



# CÓMO PUEDE AYUDAR ORGOVYX

ORGOVYX se estudió en un ensayo clínico con más de 900 hombres con cáncer de próstata avanzado.

# 930



**622 HOMBRES**  
tomaron el comprimido ORGOVYX



**308 HOMBRES**  
recibieron inyecciones de leuprolida

Los hombres del ensayo fueron tratados durante 48 semanas y tomaron el comprimido ORGOVYX o recibieron inyecciones de acetato de leuprolida. El propósito del ensayo fue cómo ORGOVYX **disminuía la testosterona** hasta alcanzar el objetivo del tratamiento de menos de 50 ng/dl desde el día 29 hasta la semana 48.

Si bien no fue el objetivo principal del ensayo, el ensayo también controló qué cantidad de ORGOVYX podía **disminuir los niveles de PSA.\***

\*Dado que el ensayo clínico incluyó muchos tipos diferentes de pacientes, los resultados del control de PSA se deben interpretar con precaución. No hay evidencia que demuestre que la rapidez con que disminuye el PSA esté relacionada con un beneficio clínico.

Consulte la **Información importante de seguridad** en todo el folleto y la **Información de prescripción** completa y la **Información del producto para el paciente** sobre ORGOVYX.

**ORGOVYX**<sup>®</sup>  
(relugolix) 120 mg  
tablets

## CÓMO PUEDE AYUDAR ORGOVYX

Se demostró que ORGOVYX disminuye la testosterona y la mantiene baja

En el ensayo clínico,  
**97%**  
**DE LOS**  
**HOMBRES**

que tomaban ORGOVYX disminuyeron la testosterona (a menos de 50 ng/dl) para el día 29 y la mantuvieron baja hasta la semana 48.

Entre los hombres que recibieron inyecciones de leuprolida, en el 89 % disminuyó la testosterona para el día 29 y se mantuvo baja hasta la semana 48.

Es importante saber que cada persona es única y puede ver resultados diferentes. Hable con su médico sobre lo que pueden significar estos resultados del ensayo clínico para usted.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

#### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ORGOVYX? (cont.)

**Los efectos secundarios más frecuentes de ORGOVYX incluyen:** sofocos, aumento de los niveles de azúcar en sangre, aumento de los niveles de grasas (triglicéridos) en sangre, dolor muscular y articular, disminución de los niveles de hemoglobina en sangre, aumento de las enzimas hepáticas, cansancio, estreñimiento y diarrea.

Consulte la Información importante de seguridad en todo el folleto y la [Información de prescripción](#) completa y la [Información del producto para el paciente](#) sobre ORGOVYX.

**ORGOVYX**<sup>®</sup>  
(relugolix) 120 mg  
tablets

## CÓMO PUEDE AYUDAR ORGOVYX

**Se demostró que ORGOVYX disminuye rápidamente los niveles de testosterona**

Después de 15 días de tratamiento, **el 99 % de los hombres que tomaban ORGOVYX disminuyeron los niveles de testosterona a menos de 50 ng/dl** en el ensayo clínico, y el 12 % de los hombres que recibieron inyecciones de leuprolida disminuyeron los niveles de testosterona a menos de 50 ng/dl.



Es importante saber que cada persona es única y puede ver resultados diferentes. Hable con su médico sobre lo que pueden significar estos resultados del ensayo clínico para usted.

### **INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)**

#### **¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ORGOVYX? (cont.)**

ORGOVYX puede causar otros efectos secundarios que incluyen aumento de peso, disminución del interés sexual y problemas en la función eréctil.


**Consulte la Información importante de seguridad en todo el folleto y la [Información de prescripción](#) completay la [Información del producto para el paciente](#) sobre ORGOVYX.**

**ORGOVYX**<sup>®</sup>  
(relugolix) 120 mg  
tablets

## CÓMO PUEDE AYUDAR ORGOVYX

**ORGOVYX disminuyó los niveles de PSA, en promedio, un 92 % después de 3 meses**

En el ensayo clínico, también se controlaron los niveles de PSA. Durante los primeros meses de toma de ORGOVYX, los hombres observaron que sus niveles de PSA disminuyeron cuanto más tiempo recibieron tratamiento, y permanecieron bajos durante todo el ensayo de 48 semanas.\*



\*Si bien no era el objetivo principal del ensayo clínico, se controlaron los niveles de PSA (antígeno prostático específico). Dado que el ensayo clínico incluyó muchos tipos diferentes de pacientes, los resultados del control de PSA se debe interpretar con precaución. No hay evidencia que demuestre que la rapidez con que disminuye el PSA esté relacionada con un beneficio clínico.

Es importante saber que cada persona es única y puede ver resultados diferentes. Hable con su médico sobre lo que pueden significar estos resultados del ensayo clínico para usted.

### **INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)**

#### **¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ORGOVYX? (cont.)**

ORGOVYX puede causar problemas de fertilidad en los hombres, lo que puede afectar su capacidad para engendrar hijos. Hable con su proveedor de atención médica si esto le preocupa.

Consulte la **Información importante de seguridad en todo el folleto y la Información de prescripción completa y la Información del producto para el paciente sobre ORGOVYX.**

**ORGOVYX**<sup>®</sup>  
(relugolix) 120 mg  
tablets

## CÓMO TOMAR ORGOVYX

**ORGOVYX es un pequeño comprimido que se toma una vez al día, que puede incorporarse a su rutina**

**La dosis recomendada de ORGOVYX:**

**Primer día de tratamiento:** tome 3 comprimidos.



Los comprimidos no se muestran en tamaño real.

**Posteriormente, cada día:** tome 1 comprimido una vez al día. Tómelo aproximadamente a la misma hora cada día.



### Qué debe recordar mientras toma ORGOVYX



Tome ORGOVYX exactamente **de la manera que se lo indicó su médico**



Puede tomar ORGOVYX **con o sin alimentos**



**Trague cada comprimido entero;** no lo triture ni lo mastique



**No cambie la dosis recetada** de ORGOVYX ni interrumpa el tratamiento sin hablar primero con su médico

Su médico puede cambiar su dosis de ORGOVYX según sea necesario. Si tiene preguntas sobre su dosis, consulte con su médico.

Consulte la **Información importante de seguridad** en todo el folleto y la **Información de prescripción** completa y la **Información del producto para el paciente** sobre ORGOVYX.

**ORGOVYX**<sup>®</sup>  
(relugolix) 120 mg  
tablets

# CÓMO TOMAR ORGOVYX

## Qué debe hacer si se olvida de tomar ORGOVYX



### Si han pasado 12 horas o menos

desde que se suponía que debía tomar ORGOVYX, tómelo lo antes posible



### Si han pasado más de 12 horas

desde que debía tomar ORGOVYX, no tome la dosis que olvidó tomar. Tome la siguiente dosis de ORGOVYX en el horario habitual al día siguiente.

MÁS DE 12 HORAS



**CONSEJO RÁPIDO:** una forma simple de agregar ORGOVYX a su rutina es combinarlo con una actividad que ya haga todos los días. Por ejemplo, puede tomar su medicamento con el café de la mañana o por la noche, justo antes de prepararse para acostarse.

Consulte la Información importante de seguridad en todo el folleto y la [Información de prescripción](#) completa y la [Información del producto para el paciente](#) sobre ORGOVYX.

**ORGOVYX**<sup>®</sup>  
(relugolix) 120 mg  
tablets

## CÓMO ENTENDER LOS EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante comprender los beneficios y riesgos al comenzar un tratamiento. Hable con su médico sobre los posibles efectos secundarios de ORGOVYX. El médico puede ayudarle a comprender qué hacer si presenta efectos secundarios.

### **Antes de empezar a tomar ORGOVYX, informe a su médico acerca de todas sus afecciones médicas, incluido si usted:**

- Tiene algún problema de corazón, incluida una afección denominada síndrome de QT prolongado.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. ORGOVYX puede dañar a su bebé por nacer y causar la pérdida del embarazo (aborto).
- Tiene una pareja que está embarazada o puede quedar embarazada.
  - Los hombres que tienen parejas de sexo femenino que pueden quedar embarazadas deben usar métodos efectivos para el control de la natalidad (anticonceptivos) durante el tratamiento con ORGOVYX y durante 2 semanas después de la última dosis de ORGOVYX.
- Está amamantando o planea amamantar. No se sabe si ORGOVYX pasa a la leche materna.

### **ORGOVYX puede causar efectos secundarios severos**

ORGOVYX puede provocar cambios en la actividad eléctrica del corazón. Eso se denomina prolongación del intervalo QT. Posiblemente su médico verifique sus niveles de sales, también conocidas como electrolitos, y la actividad eléctrica del corazón mientras toma ORGOVYX.

Hable con su médico de inmediato si tiene alguno de estos signos o síntomas:

- Mareos
- Sensación de que su corazón late fuerte o en forma acelerada (palpitaciones)
- Desmayos
- Dolor en el pecho

ORGOVYX también puede causar reacciones alérgicas. Deje de tomar ORGOVYX e informe a su médico u obtenga ayuda médica de emergencia de inmediato si tiene algún signo o síntoma de una reacción alérgica, incluidos:

- Hinchazón de la cara, los labios, la lengua, la garganta o dificultad para tragar
- Dificultad para respirar
- Urticaria (ronchas elevadas), erupción cutánea o enrojecimiento en todo el cuerpo

**Informe a su médico acerca de cualquier efecto secundario** que experimente o que no desaparezca. El médico puede ayudarle a hallar maneras de tratar algunos de los efectos.

**Consulte la Información importante de seguridad en todo el folleto y la [Información de prescripción](#) completa y la [Información del producto para el paciente](#) sobre ORGOVYX.**

**ORGOVYX**<sup>®</sup>  
(relugolix) 120 mg  
tablets

# CÓMO ENTENDER LOS EFECTOS SECUNDARIOS

## Efectos secundarios frecuentes

Los efectos secundarios más frecuentes que los hombres presentaron mientras tomaban ORGOVYX fueron:



Sofocos, también conocidos como acaloramientos



Disminución de los niveles de hemoglobina en sangre



Estreñimiento



Aumento del azúcar en la sangre y/o aumento de los niveles de grasas (triglicéridos) en la sangre



Aumento de las enzimas hepáticas



Diarrea



Dolor muscular y articular



Cansancio

ORGOVYX puede causar otros efectos secundarios que incluyen aumento de peso, disminución del interés sexual y problemas en la función eréctil.

ORGOVYX puede causar problemas de fertilidad en los hombres, lo que puede afectar su capacidad para engendrar hijos. Hable con su proveedor de atención médica si esto le preocupa.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ORGOVYX. Llame a su médico para recibir asesoramiento médico sobre los efectos secundarios o si tiene un efecto secundario que le molesta o que no desaparece.

**Puede reportar efectos secundarios de los fármacos de venta con receta a la FDA. Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch), o llame al 1-800-FDA-1088.**

En el ensayo clínico, el 3.5 % de los hombres que tomaban ORGOVYX dejaron de tomarlo debido a los efectos secundarios.

**Consulte la Información importante de seguridad en todo el folleto y la [Información de prescripción](#) completa y la [Información del producto para el paciente](#) sobre ORGOVYX.**

**ORGOVYX**<sup>®</sup>  
(relugolix) 120 mg  
tablets



# CÓMO CONSEGUIR ORGOVYX

Una vez que le hayan recetado ORGOVYX, hay 2 maneras de conseguirlo



## Consultorio del médico

Algunos médicos tienen su propia farmacia en el consultorio. Si su médico es uno de ellos, es probable que obtenga allí su receta de ORGOVYX. Su médico le ayudará a conseguir que le entreguen el medicamento directamente en su hogar.



## Farmacia especializada

Este tipo de farmacia tiene medicamentos que no se pueden conseguir en las farmacias regulares. Una farmacia especializada puede entregarle ORGOVYX directamente a su hogar.



Si necesita ayuda para conseguir ORGOVYX,  
**llámenos al 1-833-ORGOVYX (1-833-674-6899)**  
**de lunes a viernes, de 8 A. M. a 8 P. M. ET.**

Consulte la Información importante de seguridad en todo el folleto y la [Información de prescripción](#) completa y la [Información del producto para el paciente](#) sobre ORGOVYX.

**ORGOVYX**<sup>®</sup>  
(relugolix) 120 mg  
tablets

## Cómo conseguir ORGOVYX de una farmacia especializada

Para ayudarle a comprender cómo conseguir ORGOVYX de una farmacia especializada, **simplemente recuerde:**

# LAS 3 "P"



### 1. Papeleo

El consultorio de su médico completará el papeleo requerido. Lo enviarán a la farmacia especializada.

**CONSEJO RÁPIDO:** consulte con su médico para asegurarse de que todos sus formularios estén completos y listos para enviar.



### 2. Llamado de la farmacia (Pharmacy)

Una vez que se ha enviado todo el papeleo, la farmacia especializada lo llamará. Pueden ayudarle a comprender cuánto puede costar su medicamento y programarán su entrega. Es importante que responda esta llamada. La farmacia especializada tendrá que comunicarse con usted para completar el procesamiento de su receta.

**CONSEJO RÁPIDO:** guarde el número de la farmacia especializada en su teléfono para una fácil referencia. Eso también le ayudará a reconocer el número cuando lo llamen para los recordatorios de un nuevo surtido.



### 3. Entrega de la receta (Prescription)

Después de que su farmacia especializada lo llame, se entregará ORGOVYX directamente en su hogar. Si necesita ayuda durante algún paso de este proceso, su médico o farmacia especializada pueden ayudarle.

Consulte la **Información importante de seguridad** en todo el folleto y la **Información de prescripción** completa y la **Información del producto para el paciente** sobre ORGOVYX.

**ORGOVYX**<sup>®</sup>  
(relugolix) 120 mg  
tablets

# APOYO PARA EMPEZAR Y AYUDA PARA MANTENER EL CAMINO



El Programa de Ayuda de ORGOVYX le ofrece apoyo personalizado para ayudarle a que el inicio del tratamiento con ORGOVYX sea lo más simple posible, y le brinda herramientas y recursos para apoyarlo durante todo el tratamiento.



## **Apoyo personalizado de enfermería**

Una vez que se haya inscrito, nuestro equipo de enfermería\* lo ayudará a responder preguntas generales sobre ORGOVYX y ofrecerle consejos sobre el estilo de vida



## **Asistencia con la cobertura del seguro**

Información para ayudarle a comprender los beneficios y la cobertura de su seguro para ORGOVYX



## **Asistencia financiera**

Ayuda con las opciones de apoyo financiero, incluida la asistencia con copagos para pacientes elegibles. Aplican términos y condiciones†



## **Recursos educativos**

Recursos educativos para ayudarle a comenzar el tratamiento, incluido un kit de bienvenida para el paciente



### **¿Tiene preguntas sobre ORGOVYX?**

Estamos aquí para asistirle. Nuestro equipo está disponible de lunes a viernes, de 8 A. M. a 8 P. M. ET. **Llámenos al 1-833-ORGovyX (1-833-674-6899).**

\* La finalidad de los consejos del personal de enfermería del Programa de Ayuda de ORGOVYX no es reemplazar la consulta con su médico.

† Consulte los términos y condiciones en la página 20.

**Consulte la Información importante de seguridad en todo el folleto y la Información de prescripción completa y la Información del producto para el paciente sobre ORGOVYX.**



# APOYO PARA EMPEZAR Y AYUDA PARA MANTENER EL CAMINO

**Los coordinadores de ayuda de ORGOVYX están aquí para ayudarle a tratar de encontrar formas para conseguir y pagar su medicamento.**

## **Ayuda para consultar al seguro**

Nuestros coordinadores de ayuda pueden ayudarle a comprender los beneficios de su seguro y la cobertura para ORGOVYX.

## **Ayuda con el pago**

Podemos ayudarle a obtener información sobre los programas de asistencia económica disponibles para ayudarle a cubrir los costos de su bolsillo para ORGOVYX.

## **Pague tan solo \$10 al mes por ORGOVYX\***

Si tiene seguro a través de su trabajo o uno que compró usted mismo (habitualmente denominado seguro comercial), puede que sea elegible. Se aplican términos y condiciones.\*

**Obtenga más información en [orgovyx.com](https://orgovyx.com).**

## **\*Programa de asistencia para copagos de ORGOVYX: Términos y condiciones**

El Programa de asistencia para copagos de ORGOVYX ("Programa de copagos") es para pacientes elegibles con seguro comercial de medicamentos con receta para ORGOVYX. Con este Programa de copagos, los pacientes elegibles pagarán tan solo \$10 por mes, sujeto a un máximo de \$10,000 por año calendario. Después de alcanzar el máximo anual de \$10,000 para ORGOVYX, el paciente será responsable de los gastos de bolsillo mensuales restantes. Este Programa de copago no se puede canjear más de una vez cada 21 días. El Programa de copago no es válido para pacientes cuyas reclamaciones de recetas sean reembolsadas, en su totalidad o en parte, por cualquier programa del gobierno estatal o federal, incluidos, entre otros, Medicaid, Medicare, Medigap, Departamento de Defensa (DoD), Asuntos de Veteranos (VA), TRICARE, Seguro del Gobierno de Puerto Rico, o cualquier programa estatal de asistencia farmacéutica o de pacientes. La oferta no es válida para pacientes que pagan en efectivo. El paciente debe ser residente de los EE. UU., Puerto Rico o territorios de los EE. UU. Este Programa de copagos es nulo donde lo prohíba la ley estatal y en la fecha en que esté disponible un equivalente genérico AB para ORGOVYX. Se aplican ciertas reglas y restricciones. Esta oferta no es un seguro. Esta oferta no se puede combinar con ningún otro cupón, prueba gratuita, descuento, tarjeta de ahorro para recetas u otra oferta. Esta oferta no está condicionada a ninguna compra pasada, presente o futura, incluido el resurtido. El paciente y los farmacéuticos participantes acuerdan no solicitar el reembolso total o parcial del beneficio recibido por el paciente a través de este Programa de copagos. El paciente y los farmacéuticos participantes acuerdan reportar la recepción de los beneficios del Programa de copagos a cualquier aseguradora u otro tercero que pague o reembolse cualquier parte de la receta surtida usando la Tarjeta, según lo requiera dicha aseguradora o tercero. Sumitomo Pharma America se reserva el derecho de revocar, rescindir o modificar esta oferta sin previo aviso. El Programa de copagos de ORGOVYX es válido hasta el 31 de diciembre de 2024.

**Consulte la Información importante de seguridad en todo el folleto y la Información de prescripción completa y la Información del producto para el paciente sobre ORGOVYX.**

**ORGOVYX<sup>®</sup>**  
**(relugolix) 120 mg tablets**



**ORGOVYX**<sup>®</sup>  
(relugolix) 120mg  
tablets



Si tiene preguntas sobre ORGOVYX,  
estamos aquí para ayudarle.

**1-833-ORGOVYX (1-833-674-6899)**  
**de lunes a viernes, de 8 A. M. a 8 P. M. ET.**

◆ es una marca comercial de Sumitomo Pharma Co. Ltd. que se utiliza bajo licencia. SUMITOMO PHARMA es una marca comercial de Sumitomo Pharma Co. Ltd. que se utiliza bajo licencia. SUMITOMO es una marca comercial registrada de Sumitomo Chemical Co. Ltd. que se utiliza bajo licencia. Sumitomo Pharma America Inc. es una subsidiaria de EE. UU. de Sumitomo Pharma Co. Ltd. ORGOVYX<sup>®</sup> y su logotipo asociado son marcas comerciales registradas de Sumitomo Pharma Switzerland GmbH. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

©2024 Sumitomo Pharma Switzerland GmbH y Pfizer Inc. Todos los derechos reservados. ORG-US-2151-24 08/24

◆ Sumitomo Pharma 